



KEMİRGEN MÜCADELE PROGRAMI

- İstasyonların kümes içinde 15 metrede, kümes etrafında 25 m ve çiftlik çevirme telleri boyunca her 25 metrede bir yerleşimi öngörülmektedir.
- Yerde yetiştirilen sürülerde kümes içine istasyon koymamakla birlikte, pano odasına yerleşim planlanmalıdır.
- Kafeste yetiştirme yapıyorsa mutlaka kümes içinde de 15 – 20 m’ de bir yemleme istasyonu kurulmalıdır.
- İstasyonların delik kısımları duvara bitişik ve paralel olacak şekilde yerleşimi uygun olmalıdır. İstasyonları duvar kenarlarına, köşelere ve paletlerin altına yerleştiriniz.
- Her istasyona 25 - 50 g mum blok veya pasta yem konulmalıdır. Pelet yemleri yem istasyonunun içerisindeki yem bölmelerine boşaltınız. Blok ve pasta yemleri yem istasyonunun içerisindeki yem tellerine takınız. Yemlere çıplak elle dokunmayıp eldiven kullanınız.
- En az her 15 günde bir istasyonlar gözlemlenmeli, eksilen yemler takviye edilmelidir. Ayda bir yemler yenileri ile mutlaka değiştirilmelidir. Yem istasyonlarının yerleri değiştirilmemelidir.
- İstasyondan çıkan yemleri çiftlik çevirme telleri boyunca araziye atabilirsiniz.
- Gözlemeleme (monitoring) sonuçları her seferinde oluşturulacak bir raporla kayıt altına alınmalıdır.
- Hareket gözlenen istasyonlar daha fazla yemlenmelidir.
- İyi bir rodent kontrol programında hareket tespit edilen istasyon % 5’den az olmalıdır.



Hijyenik Paspas

Fare yem istasyonu
ve fare yemleri

Dezenfektan